

## Comag plant f supozitoare 1.5g 10 gr CONIMED



**Recomandari ale producatorului**  
**COMAG PLANT® F**  
**Crema Solida (SUPOZITOARE)**

**INGREDIENTS:** CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL, ORIGANUM MAJORANA LEAF OIL, HYDROGENATED VEGETABLES GLYCERIDES, BEESWAX, OIL EXTRACT OF PINE RESIN, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CHELIDONIUM MAJUS EXTRACT, INULA HELENIUM EXTRACT, ORIGANUM VULGARE OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS FLWER OIL, ARTEMISIA ABSTHIUM OIL, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, SIMMONDSIA CHINESIS OIL, SALIX ALBA BARK EXTRACT. **Ingrediente:** extract hidroalcoolic si uleios din: cozi de cirese (Cerasi stipes), pelin (Artemisia absinthum), galbenele (Folinica sau Calendulae flos), sovârv (Origani herba), rozmarin (Rosmarini herba), radacina de conifere, ulei esential de: coriandru (Aetheroleum coriandri), maghiran (Marjorana hortensis), salvie (Salvia oll), ulei de masline (Oleae fructum), ceara de albine (Cera flava), ulei vegetal hidrogenat.

**COMPONENTELE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI SUNT:** ulei esential bogat în alfa si betatuiona, fencona, polizaharide, acizi terpenici (rezinici), abietic, levopimamic, dextrosapinic, acizi aromatici sau alifatici, acid benzoic si derivatii fenil propanici (acid cinamic, ferulic si cumaric); rezinoli (alcooli aromatici superiori, fenoli, alcooli terpenoidici), ceruri, polizaharide, glicoproteine, flavonoide, acizi polifenolici, carotenoizi, taninuri, oligoelemente. **ACTIUNE:** antiseptica, antalgica, tonica generala, antioxidantă, detoxifiantă, antiinflamatoare urinara, confortanta, cicatrizanta, antitricomoniazica, imunostimulatoare, antiparazitara, cu efect de inhibare a tumorilor (rozmarinul), antimicrobiana, antiinfectioasa, etc. **UTILIZÄ,RI:** produsul COMAG PLANT F conditionat sub forma de supozitoare, ovule, baghete tronconice se adreseaza în special femeilor si poate fi utilizat ca **ADJUVANT** în tratamentul afectiunilor uro-genitale, hemoroidale, vaginitelor atrofice, tricomonas vaginalis, disnenarei (menstruatie cu dureri), metrorargii (hemoragie uterina în afara perioadelor menstruatiei), afectiuni inflamatorii urinare, cistite, chisturi ovariene. **MOD DE ADMINISTRARE:** **La femei:** aplicatii locale (intrarectal) 1 supozitor de 2-3 ori pe zi începând cu ziua a 3-a a ciclului menstrual timp de 15 zile pe luna timp de 3 luni consecutiv. Intravaginala administrarea produsului se va face numai cu acordul medicului si sub supravegherea lui. **La barbati:** în cazul afectiunilor hemoroidale, pentru îngrijirea tegumentelor si mucoaselor inclusiv în zona ano-rectala 1 supozitor de 2 ori pe zi timp de 20 de zile, 3 luni consecutiv. **La copii:** nu s-au facut studii clinice, doar medicul poate stabili utilizarea lui. **ATENTIONÄ,RI:** nu poate fi utilizat de femeile gravide sau cele care alapteaza, bolnavi cu afectiuni psihice decât cu avizul medicului si sub supravegherea lui. Nu poate fi folosit de persoanele care au alergie la unul din ingrediente. Daca apar fenomene neplacute consultati medicul sau farmacistul. **PREZENTARE:** Cutii sau blister cu 10 supozitoare, baghete tronconice sau ovule a 1gr; 1,5gr. **PÄ,STRARE:** la loc racoros cu

temperaturi de 4-15°C, în ambalajul original. **TERMEN DE VALABILITATE:** A se folosi de preferință înainte de data de expirare înscriisa pe ambalaj.