



Tinctura de valeriana 50 ml HOFIGAL

Compoziție

Radacina de valeriana (*Valerianae radix*) 20 g și alcool etilic 70% v/v pentru 100 g soluție.

Utilizare / administrare

Cate 10 picături diluate în 50ml apă, de 3 ori pe zi, după mese. În tulburările minore de somn câte 15 - 20 picături diluate în 50 ml apă, administrate cu jumătate de oră înainte de culcare (această administrare poate fi precedată de încă o doză similară în cursul serii în insomnia severă).

După diluare, concentrația de alcool scade la un nivel de concentrație homeopatică și nu comportă contraindicații legate de toxicitatea acestuia.

Actiune

- inhibitor al secrețiilor gastrice
- antispastic
- antiemetic
- sedativ
- inhibitor neuromuscular
- anti hipertensiv

Indicatii

- stare de vomă
- migrene, în special în cele de etiologie etilică
- urticarie - mai ales în formele cu prurit intens greu de tolerat
- dismenoreea asociată cu simptome vegetative de tipul: nervozitate, palpitații, insomnii, crize de plans - administrarea făcându-se pe perioada menstriei
- hipertiroidie - ca tratament simptomatic pentru corectarea tulburărilor neurovegetative
- patologia nevrotică, mai ales în sindroamele reactive
- cardiopatie ischemică, extrasistole, hipertensiune arterială (mai ales în timpul puseelor de hipertensiune)

Contraindicatii

Produsul este bine tolerat, fără contraindicații semnificate până acum la dozele și ritmul de administrare recomandate.

Nu produce dependență și nu creează somnolență, stare de amețea și obnubilare la trezirea din somn.

Nu se recomandă în sarcină, perioada de alăptare, la persoane cu hipersensibilitate la valeriană, copii până la vârsta de 12 ani.

Ca o masura de precautie, trebuie evitata administrarea concomitent cu alte preparate cu efect sedativ sau hipnotic, deoarece valeriana poate potentia efectul altor preparate care deprima sistemul nervos.

Se va evita administrarea inainte de conducerea unui vehicul si la persoane a caror profesie impune performante psiho-motorii riguroase.

Nu se recomanda administrarea produsului in asociere cu consumul de alcool.