

Crema solida hemorozin supozitoare 1.5gr 10 gr HEMOROZIN



Hemorozin Crema Solida (supozitoare) - blistere 10 buc.x1.5 g.

Ingrediente: extract de coada soricelului, tataneasa, galbenele si scoarta de stejar, extract uleios de rasina de conifere, ceara de albine, ulei de masline, witepsol (ulei de palmier si cocos solidificat).

Actiune: Se utilizeaza ca adjuvant in tratamentul bolii hemoroidale, fisuri, fistule anale, afectiuni genitale si ale prostatei, colon iritabil.

Pentru a mari eficacitatea produsului in tratamentul hemoroizilor interni sau externi, fisuri anale si a colonului iritabil se poate utiliza un ceai constituit dintr-un amestec de musetel 50gr, urzica 100gr, scoarta de stejar 100gr, papadie 50gr, zece nuci cu coaja care se piseaza cu totul, menta 50gr, lavanda 50gr, galbenele 100gr. Aceste plante se amesteca bine formand un ceai deosebit de eficient.

Prepararea ceaiului: la doi litri de apa plata se pun 6-8 linguri rase de ceai (amestec), se da in clocot 2 minute, dupa care se acopera si se lasa la racit. Se strecoara, un litru se be in cursul zilei, iar cu un litru se fac bai de sezut dimineata si seara, ceaiul incalzindu-se la nivelul suportabilitatii.

Atentie: compozitia care ramane se inveleste intr-un tifon si se pun comprese calde seara pe burta 1-2 ore.

Tratamentul dureaza cel putin doua saptamani.

Attentionari: nu poate fi utilizat de persoanele care au alergii la unul din ingredientele folosite.

Doze si mod de utilizare: doza uzuala este de un supozitor Hemorozin intrarectal, doua tre ori pe zi, dupa defecatie si dupa toaletarea locala. Pentru a introduce supozitorul, indepartati folia protectoare.

Durata tratamentului este de douazeci de zile pe luna, timp de trei luni sau pana la disparitia completa a fenomenelor locale. Este indicat ca pe perioada tratamentului sa se tina un regim alimentar adecvat si utilizarea ceaiului mai sus mentionat.

Prezentare: Cutii sau blistere cu 10 supozitoare a 1gr, 1.5 gr, 2gr.

Conditii de pastrare: a se pastra la loc uscat si racoros la o temperatura cuprinsa la 4 -15 °C

Contradictii: Nu se cunosc.

Acest produs se poate elibera fara prescriptie medicala.