

Eridiarom 50 cpr PLANTAROM



Regleaza tranzitul intestinal, circulatia capilara, stimuleaza refacerea celulelor beta (pancreas), mareste acuitatea vizuala, prevenirea si tratarea diareelor neonatale (a nou-nascutilor) nespecifice, a diareelor specifice. *

Prin compozitia lui complexa, **reechilibreaza presiunea osmotica de la nivelul celulelor epiteliului mucoasei intestinale**, normalizeaza peristaltismul si tranzitul intestinal, avand rol protector al mucoasei.*

Restabileste **rezistenta si permeabilitatea** capilara, intervine in **tonifierea sistemului venos**.

Prin **continutul in flavonoide**, produsul intervine in

reglarea cardiovasculara.*

Prin efectul activant asupra regenerarii purperei retiniene, sensibilizeaza fotoreceptorii, marind acuitatea vizuala.*

Glucozidele delfinolului, mirtilina si neomirtilina continute de concentratul natural din fructe de *Vaccinium myrtillus* L. au actiune hipoglicemianta, produsul avand efecte in refacerea celulelor beta din **insulele Langerhans si protectia pancreasului.***

Eridiarom micșoreaza peristaltismul intestinal, fara a constipa; este astringent al mucoasei gastro-intestinale, bacteriostatic, antiseptic, antihistaminic, antiparazitar si hipoglicemiant. Regleaza permeabilitatea vasculara si tranzitul intestinal, fiind absorbant si protector al mucoasei, pe care o reface. Restabileste rezistenta vasculara si tonifica sistemul venos, marind acuitatea vizuala. In formele usoare de diabet, Eridiarom se poate asocia cu insulinoterapia, determinand reducerea cantitatii de insulina injectabila.*

In urma cercetarilor clinice, a rezultat ca Eridiarom este indicat in:

1. prevenirea si tratarea **diareelor neonatale** (a nou-nascutilor) nespecifice, a diareelor specifice;*
2. colite, enterocolite, rectocolite ulcero-hemoragice;*
3. fragilitatea si tulburarile permeabilitatii vaselor capilare;*
4. **afectiuni oftalmologice;***
5. tratamentul adjuvant al arteriopatiilor (arterite ale membrelor inferioare, ateroscleroza, hipertensiune arteriala, sechele dupa infarct miocardic, coronarite, tulburari vasculare de senescenta);*
6. **diabet** si maladiile vasculare ale diabeticilor. De asemenea, poate fi folosit cu eficienta maxima de catre bolnavii tratati in spitalele oncologice, avand rol protector in timpul iradierilor terapeutice,

care dau de multe ori efecte secundare, in special diaree.*

La toxiinfectiile alimentare, rezultatele cele mai bune se obtin la 24 de ore de la declansarea diareei, timp necesar sa se permita golirea tubului digestiv. Rezultate foarte bune s-au obtinut si in tratarea colonului iritabil si mai ales a bolii Crohn (considerata incurabila!)*