


Enzime din papaya 60 tbl NATURAL FACTORS

Descriere:



Enzimele de papaya masticabile cu amilază și bromelaină sunt aromate în mod natural și ajută organismul să descompună proteinele, grăsimile și carbohidrații, îmbunătățind în același timp absorbția nutrienților. Enzimele ajută la stimularea bacteriilor bune din tractul digestiv, detoxifică și curăță colonul și îmbunătățesc digestia.

Papaina, o enzimă extrasă din fructele de papaya (*Carica papaya*), stimulează pofta de mâncare și ajută digestia. Este bun pentru ameliorarea indigestiei și arsurilor la stomac și ajută organismul să digere proteinele, grăsimile și carbohidrații. Bromelina, provenită din tulpina ananasului (*Ananas comosus*), ajută organismul să digere proteinele, grăsimile și zaharurile. Amilaza provenită din *Aspergillus oryzae*, începe procesul de digestie și descompune amiloza, o formă de amidon din carbohidrați și zaharuri.

Amilaza este o enzimă care catalizează hidroliza amidonului, fiind prezentă în saliva oamenilor și a mamiferelor, acolo unde începe procesul chimic de digestie.

Papaya este folosită în curele de slăbire și a dat rezultate bune în tratarea celulei.

CINE ARE NEVOIE:

- Persoanele care au probleme digestive, în special la gluten și grăsimi animale
- Persoanele care sunt la cură de slăbire
- Persoanele care au celulită

COMPOZIȚIE:

Ingrediente/tabletă: Amestec brevetat cu coloranți naturali (dextroză; fructoză; coloranți naturali: Annato/Bixa orellana și Turmeric/Curcuma longa; Pulbere de Emblica officinalis - 10mg; Acid citric; Pulbere din fructe de Papaya/*Carica papaya** - 3,5mg) - 378,8g; Amestec de enzime digestive RM 501472 (papaină, amilază bromelaină) - 40mg*; Agent antiaglomerant: săruri de magneziu ale acizilor grași (*o tabletă masticabilă furnizează: 17,75mg/300000 USP PU papaină din Papaya/*Carica papaya*; 20mg/416,6 FCC DU amilaza/*Aspergillus oryzae* și 2,25mg/32000 FCC PU bromalină din Ananas/*Ananas comosus*).

ADMINISTRARE:

Doză recomandată (adulți): câte o (1) tabletă de 3-4 ori pe zi în timpul meselor, sau după cum vă recomandă specialistul. Pentru o administrare de lungă durată, consultați specialistul.