



Sirop pentru burtica 200 ml INGERASUL

Sirop Pentru Burtica este un produs natural recomandat pentru mentinerea sanatatii tractului gastrointestinal la copii.

Colicii reprezinta durerile abdominale foarte intense, cu caracter spastic, ce apar la 25-30% din sugari incepand cu varsta de 2-3 saptamani. Ele dureaza pana la 3-4 luni, fiind insotite de manifestari specifice: plans violent si inexplicabil, inrosirea fetei, frecarea picioruselor si indoirea acestora spre burtica, strangerea pumnilor si a manutelor spre torace, agitare si iritabilitate, refuzul alimentelor, dificultati de adormire din cauza durerii etc. Crizele apar in episoade de cate 20-30 de minute, insa uneori pot ajunge la cateva ore, avand un caracter repetitiv. Ele nu apar, de regula, in timpul meselor, ci la 1-2 ore dupa masa. Cauza reala a colicilor la bebelusi nu se cunoaste inca. Se presupune ca acestea s-ar datora procesului de adaptare a tubului digestiv al sugarului la alimentatia extraterina, precum si florei intestinale insuficient dezvoltate. Plansul, de altfel, este un mod de comunicare al sugarilor prin care ei ne anunta ca le este foame, frig, somn, ca este ud sau ii doare ceva. Pentru linistire se recomanda administrarea unor produse naturale care sa elimine spasmele si durerile abdominale, precum si unele masuri empirice, cum ar fi: asezarea unei perne caldute pe abdomen, tinerea in brate si leganarea, mangaierea usoara pe abdomen, asezarea pe burtica, realizarea unei bai caldute etc.

Dupa varsta de un an, colicile abdominale indica debutul unei boli (cum ar fi gripa, virozele respiratorii etc.), mai ales daca durerea este insotita de febra. Cele mai frecvente boli manifestate cu crampe abdominale sunt infectiile intestinale, acestea fiind insotite de scaune diareice si varsaturi. Numite si gastroenterite, infectiile tractului digestiv sunt cauzate de bacterii si virusuri. Durerile abdominale pot avea insa numeroase alte cauze, cum ar fi constipatia, apendicita, toxiinfecția alimentara, stresurile emotionale puternice etc. Daca durerile abdominale persista un timp mai indelungat, consultarea medicului pediatru este obligatorie.

Mod de administrare

Copii sub 6 luni: cate 2,5 ml de sirop de 3 ori pe zi.

Copii 6 luni -12 luni: cate 5 ml de sirop de 2-3 ori pe zi.

Copii 2 an - 6 ani: cate 5 ml de sirop de 3-4 ori pe zi.

Se administreaza ca atare sau diluat in 50 ml de ceai sau apa (1/4 de pahar), cu 30 de minute inaintea mesei.

Siropul se intrebuinteaza la nevoie.

Ingrediente

Fructoza (70%); apa (8,445%); extract moale din Mix special colic* (20%); carbune activ (0,77%);

morcov (*Daucus carota*) a€“ extract 10:1 din radacini (0,77%); ulei esential de anason (*Pimpinella anisum*) (0,005%); ulei esential de anason stelat (*Illicium verum*) (0,005%); ulei esential de menta (*Mentha piperita*) (0,005%).

* extract moale obtinut din Mix special colic: anason (*Pimpinella anisum*), fructe (15%); chimen (*Carum carvi*), fructe (15%); fenicul (*Foeniculum vulgare*), fructe (15%); musetel (*Matricaria chamomilla*), flori (10%); busuioc (*Ocimum basilicum*), parti aeriene (9%); roinita (*Melissa officinalis*), parti aeriene (8%); tei (*Tillia tomentosa*), flori (8%); coada-racului (*Potentilla anserina*), parti aeriene (5%); dafin (*Laurus nobilis*), frunze (5%); iarba de lamaie (*Cymbopogon citratus*), parti aeriene (5%); rozmarin (*Rosmarinus officinalis*), parti aeriene (5%).

Contribuie la

- normalizarea contractiilor intestinale la copii
- reducerea acumularii gazelor intestinale si facilitarea eliminarii acestora
- mentinerea tranzitului intestinal normal
- eliminarea toxinelor din intestin
- sustinerea digestiei

Contraindicatii

Intoleranta la oricare dintre componentele produsului.