

## Fitodiab 60 cpr HOFIGAL



**Compozitie:** 1 comprimat contine 100 mg pulbere din fructe de afin (*Myrtilli fructus*), 75 mg pulbere din frunze de dud alb (*Mori alba folium*), 50 mg pulbere din teci de fasole fara seminte (*Phaseoli fructus sine seminibus*), 25 mg pulbere din frunze de mestecan (*Betulae folium*) si excipienti (lactoza, amidon de porumb, polivinilpirolidona K30, hidroxipropilmetilceluloza, stearat de magneziu, talc) pana la 450 mg.

**Recomandari:** Produsul are actiune hipoglicemianta, hipolipemianta, antioxidanta. Poate fi folosit ca adjuvant in diabet zaharat de tip II (noninsulino-dependent) cu sau fara exces ponderal. Prin actiunea sa preponderent periferica, produsul poate fi asociat insulinoterapiei in diabetul zaharat de tip I (insulino-dependent), inducand o mai buna echilibrare a bolii, fara ca insulinoterapia sa fie intrerupta.

**Precautii:** utilizarea produsului in asociere cu medicatia antidiabetica conventionala impune un control medical si de laborator periodic. Produsul este bine tolerat, dar la bolnavii cu ulcer gastric sau duodenal, pentru a evita eventualele iritatii gastro-duodenale, comprimatele se vor administra in timpul mesei.

### Mod de administrare:

Dependent de tipul bolii si de nivelul glicemiei, doza utilizata variaza intre 2-6 comprimate/zi si anume:

- la bolnavii cu diabet zaharat de tip II, cu nivelul glicemiei cuprins intre 120-150 mg/dl, 2 comprimate/zi la fiecare masa principala;
- la bolnavii cu diabet zaharat de tip II, cu nivelul glicemiei cuprins intre 150-200 mg/dl, 4 comprimate/zi, cate una la fiecare din cele trei mese principale si una la gustarea de la ora 11;
- la bolnavii cu diabet zaharat de tip II, cu nivelul glicemiei mai mare de 200 mg/dl, 6 comprimate/zi, cate una la cele trei mese principale si la cele trei gustari.