

Gemoderivat din mladite de afin - monodoze 30 ml HOFIGAL



Compozitie: o monodoza de 1,5 ml contine extract glicerohidroalcoolic diluat 1DH din mladite proaspete de afin (*Vaccinium myrtillus*). Contine alcool etilic 45% in vol.

Actiune: vasoprotectoare (reduce fragilitatea si alterarea permeabilitatii capilare, antiedematoasa si antiinflamatoare), protectoare si regeneratoare a tesutului retinian, antiagreganta plachetar, antitrombofilica, stimuloare asupra metabolismelor glucidic, proteic si purinic (hipoglicemianta, uricozurica, de reducere a excesului ureei), drenor renal si pancreatic in tulburari metabolice, astringenta, antiinflamatoare, antiedematoasa si antiseptica intestinala, reepitelizanta si regeneratoare a mucoaselor si a tesutului conjunctiv cutanat.

Recomandari: tulburari de vedere cu diminuarea acuitatii vizuale (hemeralopie, hemianopsie, nictalopie), miopie severa, diminuarea campului vizual, protector vascular in retinopatia diabetica si hipertensiva, retinita pigmentara, retinopatia senila, dezlipire de retina, uveite; enterocolite, dizenterie, enterite infantile, colibaciloza intestinala, colita ulcero-membranoasa, disbioze intestinale, colon iritabil, tulburari dispeptice (meteorism, colici intestinale, diaree, fermentatie intestinala excesiva); stomatite, gingivite, aftoza bucala, ulcer gastro-duodenal; microarteriopatii, stari de fragilitate capilara, staza venoasa, trombofilie, ulceratii diabetice; diabet zaharat, exces de uree, hiperuricemie; acnee juvenila, cuperoza, modificari cutanate senile (piele, uscata, flasca, tesut conjunctiv alterat).

Mod de administrare: Adulti si copii peste 7 ani: 1 monodoza de 1,5 ml extract diluata in putina apa, de 2-3 ori pe zi, cu 15 minute inainte de mesele principale; in asocieri 1 monodoza de 1,5 ml extract o data pe zi.

Copii cu varsta intre 2-7 ani: 1/2 din doza adultului sau dupa recomandarea medicului.

Preparatul diluat se tine cat mai mult in gura pentru favorizarea absorbtiei prin mucoasa bucala si apoi se inghite treptat.

În functie de afectiune se poate asocia cu alte extracte glicerohidroalcoolice: in retinite cu frasinul si coacazul negru; in retinopatie diabetica si diabet cu dudul; in microarteriopatie cu castanul; in gingivo-stomatita aftoasa cu arinul negru si nucul; in diaree si dizenterie de origine infectioasa cu nucul si merisorul de munte; in meteorismul dat de fermentatia intestinala excesiva cu nucul etc. La recomandarea medicului se pot schimba asocierile.