

## Hepastim 40 cps HOFIGAL



**Compozitie:** o capsula contine 290,00 mg pulbere fruct de catina degresat (*Hippophae fructus*), 55,00 mg pulbere din fruct de armurariu (*Cardui marianae fructus*), 55,00 mg extract de anghinare (*Cynara scolymus*), 1,74 mg ulei volatil de rozmarin (*Rosmarini aetheroleum*), 1,16 mg ulei volatil de fenicul (*Foeniculi aetheroleum*) si excipienti (lactoza, amidon, aerosil, polivinilpirolidona K30, stearat de magneziu, talc) pana la 580,00 mg.

**Actiune:** protejeaza si stimuleaza procesul de regenerare a celulei hepatice; contribuie la normalizarea valorilor transaminazelor serice; poseda actiune detoxifianta si antioxidanta (de cateva ori mai puternica comparativ cu vitamina E, induce cresterea activitatii superoxid dismutazei - SOD); colagog-coleretica (de stimulare a fluxului biliar si de imbunatatire a digestiei grasimilor); antiinflamatorie; hipolipemianta; cu rol important in procesul de echilibrare a sistemului imunitar.

**Recomandari:** asigura aportul de substante bioactive care furnizeaza nutrienti esentiali necesari regimului igienico-dietetic persoanelor cu afectiuni hepato-biliare cronice, persoanelor dependente de alcool si droguri sau celor care traiesc sau activeaza in zone poluate; pentru diminuarea efectelor negative ce pot sa apara in tratamentele medicamentoase de lunga durata (se realizeaza o dieta cu rol de protectie a celulei hepatice si efect depurativ pentru eliminarea substantelor daunatoare hepatotoxice).

Este adjuvant valoros in hepatita cronica, ciroza, insuficienta hepatica, steatoza hepatica, icter, angiocolite, afectiuni inflamatorii si de motilitate ale vezicii biliare, in tratamentul hepatitei C si a cancerului hepatic, alte neoplazii, in perioada tratamentelor chimioterapice si radioterapice (favorizeaza detoxifierea si eliminarea produsilor de degradare metabolica rezultati); in dislipidemii, ateroscleroza; constipatie cronica, indigestii, toxiinfectii alimentare; alergii cronice la substante chimice si alergeni din mediul inconjurator.

**Mod de administrare:** Cate 1 - 2 capsule de 3 ori pe zi cu 15 minute inainte de mesele principale, in functie de afectiune sau la recomandarea medicului. Se poate administra in cure prelungite (3 luni).