



Imunorezistan junior 125 ml PLANTEXTRAKT

Raceala si gripa

Reduce intensitatea simptomelor din starea de curbatura (dureri musculare si osteo-articulare, cefalee asociata cu dureri ale globilor oculari)

Revigoreaza organismul

Grabeste vindecarea

Bine tolerat de organism

Lipsit de toxicitate (fara reactii adverse si contraindicatii)

Gust placut de sirop natural de fructe

Usor de administrat

Compozitie: suc stabilizat si standardizat obtinut prin presare la rece din herba in florita de Echinacea purpurea (din cultura ecologica), extract gemoterapic din muguri proaspeti de Coacaz negru (din cultura ecologica) - Ribes nigrum MG=D1, extracte vegetale de Eupatorium perfoliatum, Pelargonium sidoides (Umckaloabo); sirop cu zahar invertit din fructe proaspete de Maces - Rosa canina.

Prin prelucrare in stare proaspata si extractie la rece (metoda de fabricatie Plantextrakt) se pastreaza nealterat fitocomplexul responsabil de actiunea terapeutica.

Recomandari:

Sustine refacerea si revitalizarea organismului copiilor in timpul infectiilor respiratorii - recomandat la debutul infectiilor de tip viral si/sau bacterian ale cailor respiratorii superioare.

Preparatul asociaza efectului imunostimulator dat de Echinacea purpurea, actiunea antiinflamatoare data de Eupatorium perfoliatum - recomandat in curbatura musculara insotita de dureri osoase si cefalee asociata cu globi oculari durerosi, precum si efectele plantei de origine africana, Pelargonium sidoides: antibacterian, antiviral si expectorant, permitand organismului sa expectoreze mucusul contaminat, creand astfel conditii mai putin favorabile pentru multiplicarea bacteriilor si virusurilor.

Mod de administrare:

- 1 - 2 ani: 3 ml de 2 ori pe zi
- 2 - 4 ani: 3 ml de 3 ori pe zi
- 5 - 7 ani: 5 ml de 3 ori pe zi
- peste 7 ani: 5 - 6 ml de 4 - 5 ori pe zi

Se poate administra si diluat in putina apa, in capacul dozator.

În prima zi se recomanda un numar dublu de administrari.

Îmbunatatirea starii generale poate apare din prima zi de administrare.

Se continua administrarea si dupa imbunatatirea starii generale, timp de inca 3-4 zile.

Mod de prezentare: sirop, flacon de 100 ml cu capac dozator.