



Feverfew (spilcuta) 30 cps SOLARAY

FEVERFEW (SPILCUTA) 350MG

30 capsules easy-to-swallow

Ajuta la reducerea aparitiei migrenelor si a manifestarilor asociate acestora.

Avantaje

- contine extract standardizat din partea aeriana de Spilcuta, 350mg/capsula
- garantat 0.7% partenolide
- capsule easy-to-swallow, usor de inghitit

Contribuie la

-reducerea frecventei, severitatii si duratei migrenelor si a manifestarilor asociate acestora (cefalee, tulburari vizuale, senzatia de amorteala sau de intepaturi la nivelul mainilor sau fetei, greata, varsaturi, sensibilitate crescuta la lumina, la stimuli auditivi sau olfactivi) prin reducerea activarii sistemului trigeminal-vascular si serotoninergic:

- » ajuta la reducerea actiunii la nivel cerebral a prostaglandinelor, tromboxanului B₄ si leucotrienelor B₄ si eliberarii fosfolipazei A₂
- » ajuta la reducerea nivelului neuronal al serotoninei
- » reduce agregarea trombocitelor si eliberarea serotoninei
- » ajuta la reglarea tonusului vaselor sangvine meningeale prin efect antagonist pe receptorii de serotonina 5 HT 1B/1D (efect vasoconstrictiv)
- » are efect relaxant prin stimularea receptorilor GABA
- cresterea eficientei terapiei alopate in faza acuta a migrenei
- reducerea durerilor menstruale si imbunatatirea fluxului menstrual: scade nivelul prostaglandinelor si relaxeaza musculatura uterina
- reducerea durerilor la nivelul urechilor, articulatiilor, plamanilor, ficatului, colonului
- » ajuta la reducerea citokinelor NF-kB, TNF- α si IL-6
- diviziunea celulara normala:
- » induce moartea programata a celulelor anormale
- reducerea reactiilor alergice IgE mediate la nivel vascular, gastrointestinal, bronsic, cutanat, cerebral si ocular:
- » ajuta la reducerea eliberarii histaminei: reduce degranularea mastocitelor prin reducerea sintezei leucotrienelor din acid arahidonic

Compozitie (Per 1 capsula)

Spilcuta 350 mg

(Tanacetum parthenium)(extract din partea aeriana, garantat 2,45mg [0,7%] partenolide)

Mod de administrare

Cate 1 capsula/zi la masa cu 200ml de apa sau conform recomandarii consultantului de specialitate.

Contraindicatii

A nu se administra femeilor insarcinate.